



# Sondage à l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé bucco-dentaire

---

Sondage Ifop pour la SFPIO

Février 2019

N° 116174

Contacts Ifop :

Fabienne Gomant / François Legrand

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

[Prenom.nom@ifop.com](mailto:Prenom.nom@ifop.com)



# 1 | La méthodologie

## Etude réalisée par l'Ifop pour la SFPIO

### Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon principal de **1008** personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

### Méthodologie



La représentativité de l'échantillon principal a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

### Mode de recueil




Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 19 février 2019.


*Note de lecture :* ▲ ▼ : désignent des différences significativement supérieures / inférieures par rapport à la moyenne de l'échantillon.

# 2 | Les résultats de l'étude

**QUESTION :** Vous personnellement, êtes-vous concerné(e) par la peur de perdre ses dents ?



**QUESTION :** Selon vous, les situations suivantes correspondent-elles à des symptômes pouvant conduire à perdre ses dents ?



**QUESTION :** Vous personnellement, avez-vous déjà vécu chacune des situations suivantes ?

Total  
« OUI »

Le **saignement** des gencives


78%



▲ A peur de perdre ses dents : 86%

La mauvaise **haleine** (halitose)

60%



▲ Moins de 35 ans : 68%

▲ A peur de perdre ses dents : 67%

Le **déchaussement** des dents  
(ou récession des gencives)

37%



▲ 50 ans et plus : 46%

▲ A peur de perdre ses dents : 52%

**88%** Ont déjà vécu **au moins une** de ces situations


- Oui, de façon relativement prolongée
- Oui, le temps d'un à plusieurs jours
- Oui, mais durant un bref instant seulement
- Non, jamais

**QUESTION :** Et des deux opinions suivantes, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ? Dans ce type de situation (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents)...

Il n'y a **rien à faire**, ce sont des situations qui arrivent avec l'âge, ça ne se soigne pas

**10%**


▲ A peur de perdre ses dents : 14%




Il existe des **solutions**,  
il ne faut pas se résigner  
**90%**

**QUESTION :** Et lorsque vous vous êtes trouvé(e) dans cette(ces) situation(s) (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents), en avez-vous parlé à un dentiste ?


**Base :** A ceux qui ont eu au moins un problème bucco-dentaire (saignement des gencives, halitose ou déchaussement des dents), soit **88%** de l'échantillon



**QUESTION :** D'après vous, parmi les deux propositions suivantes, quelle est la principale cause de perte des dents ?



**QUESTION :** Selon vous, ces types de situation dentaire (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents) constituent-ils des facteurs de risques particuliers en matière de... ?



**60%** Identifient **au moins un** facteur de risque

- ▲ Femme : 64%
- ▲ 35 ans et plus : 62%
- ▲ Communes rurales : 66%
- ▲ A peur de perdre ses dents : 66%

# 3 | Les principaux enseignements

- **La peur de perdre ses dents : un sentiment dont les symptômes sont plus ou moins bien perçus**

Plus de quatre Français sur dix sont concernés par la peur de perdre ses dents (42%), un sentiment davantage partagé par les femmes (46% vs 38% des hommes) ou les personnes appartenant aux catégories populaires (45% vs 39% des CSP+).

Concernant divers problèmes bucco-dentaires, si plus de huit répondants sur dix considèrent que le déchaussement des dents peut être un symptôme conduisant à la perte des dents (85%), le saignement des gencives n'est cité que par six répondants sur dix (60%), et seuls trois sur dix identifient la mauvaise haleine comme symptôme potentiel (31%).

Par ailleurs, entre infection et inflammation, c'est la première qui est davantage perçue par les Français comme cause possible de perte des dents : en effet, les deux tiers évoquent les caries (67%) et un tiers seulement le saignement des gencives (33%).

- **Le saignement des gencives : un problème bucco-dentaire pourtant répandu**

Près de neuf Français sur dix ont déjà fait l'expérience de l'un des trois problèmes bucco-dentaires étudiés (88%), une proportion qui augmente chez les personnes ayant peur de perdre leurs dents (95%). Dans le détail, près de huit répondants sur dix ont déjà vécu un saignement des gencives (78% et 86% chez les personnes craignant de perdre leurs dents), six sur dix une situation d'halitose (60% et 67%) et près de quatre sur dix un déchaussement des dents (37% et 52%).

- **Des problèmes bucco-dentaires quasi-unaniment perçus comme curables, mais ne conduisant pas systématiquement à consulter un dentiste**

Seul un Français sur dix considère que lorsque ces problèmes surgissent il n'y a rien à faire (10%), contre neuf sur dix qui estiment qu'il existe des solutions et qu'il ne faut pas se résigner (90%). Malgré cela, parmi les personnes ayant vécu ces problèmes bucco-dentaires, seuls 25% ont pris rendez-vous chez le dentiste spécifiquement suite à l'un de ces symptômes, 43% ont attendu l'occasion d'une visite de contrôle pour lui en parler et près d'1 personne sur 3 n'est pas allée consulter (32%).

- **Des conséquences très mal connues sur l'ensemble du corps**

Seules six personnes interrogées sur dix considèrent que ces problèmes bucco-dentaires peuvent constituer des facteurs de risques d'autres maladies, mais aucune de celles-ci n'est imaginée de façon majoritaire : ainsi arrivent en tête les accidents cardio-vasculaires (37% des répondants), le diabète (35%), la polyarthrite rhumatoïde (33%), voire les maladies pulmonaires chroniques (29%). Mais le lien avec un accouchement prématuré (17%) ou un bébé de faible poids à la naissance (15%) est rarement fait.